

## CONSERVATION APRÈS OUVERTURE DES MÉDICAMENTS PÉDIATRIQUES SOUS FORME BUVABLE

Les conditions de conservation mentionnées sont assurées si les règles suivantes sont appliquées :

- Bien laver la pipette à l'eau chaude après chaque utilisation et l'essuyer avec un essuie-tout à usage unique
- Ne pas laisser la pipette dans le flacon
- Bien refermer le flacon après utilisation



Les conditions de conservation figurent sur le conditionnement des médicaments :

- **Médicaments à conserver entre +2 et +8°C** : les températures élevées devraient être sans conséquence sur leur stabilité s'ils sont utilisés assez rapidement
- **Médicaments à conserver à une température < 25 ou à 30°C** : le dépassement ponctuel, de quelques jours, de ces températures n'a pas de conséquence sur la stabilité ou la qualité de ces médicaments
- **Médicaments sans mention particulière** : conservation à température ambiante (climat français ou similaire) : dans les conditions habituelles de conservation, ces médicaments ne craignent pas une exposition aux températures élevées telles qu'observées pendant les périodes de canicule

SOURCES :  
www.ansm.sante.fr

RCP Vidal



Copyright MedQual©  
11/08/2022

SPÉCIALITÉ	DURÉE DE CONSERVATION APRÈS RECONSTITUTION	TEMPÉRATURE
<b>Durée de conservation assez courte</b>		
Amoxicilline (Clamoxyl®)	<b>14 jours</b>	entre 2 et 8°C
Amoxicilline + acide clavulanique (Augmentin®)	<b>7 jours</b>	entre 2 et 8°C
Josamycine (Josacine®)	<b>7 jours</b>	à moins de 25°C
<b>Durée de conservation courte</b>		
Cefpodoxime (Orelox®)	<b>10 jours</b>	entre 2 et 8°C
Amphotéricine B (Fungizone®)	<b>10 jours</b>	à moins de 25°C
Céfuroxime (Zinnat®)	<b>10 jours</b>	entre 2 et 8°C
Céfixime (Oroken®)	<b>10 jours</b>	à moins de 25°C
<b>Durée de conservation moyenne</b>		
Céfaclor (Alfatil®)	<b>14 jours</b>	entre 2 et 8°C
Clarithromycine (Zeclar®)	<b>14 jours</b>	à moins de 25°C
Phénoxyéthylpénicilline (Oracilline®)	<b>15 jours</b>	à moins de 25°C
Oseltamivir (Tamiflu®)	<b>17 jours</b>	entre 2 et 8°C
	<b>10 jours</b>	à moins de 25°C
<b>Durée de conservation longue</b>		
Acide fusidique (Fucidine®)	<b>28 jours</b>	à température ambiante
Sulfaméthoxazole + Triméthoprim : Cotrimoxazole (Bactrim®)	<b>1 mois</b>	à moins de 25°C
Flubendazole (Fluvermal®)	<b>3 mois</b>	à température ambiante
Ibuprofène (Advil®, Nurofen®)	<b>6 mois</b>	à température ambiante
Paracétamol (EfferalganMed®)	<b>3 mois</b>	à moins de 25°C
Paracétamol (Doliprane®)	<b>6 mois</b>	à température ambiante



Il s'agit seulement de valeurs indicatives.

Les durées et températures de conservation peuvent varier selon la forme commerciale.

Se référer avant tout à la notice du produit et au pharmacien.