

COTRIMOXAZOLE

NE PRENEZ PAS ce médicament si vous avez eu une réaction allergique à un autre antibiotique de la famille



des *Sulfamides* ([Fiche allergie](#))

MODE D'EMPLOI

Ce médicament est une association de Sulfaméthoxazole et de Triméthoprime. Il est également commercialisé sous le nom de Bactrim®.

Il est important de se conformer à la prescription médicale.



médicale.



La posologie et la durée du traitement doivent être respectées, même si l'infection semble avoir disparu.

• Les comprimés doivent être pris par **voie orale accompagnés d'un verre d'eau**.

• Une forme suspension buvable est disponible pour les enfants et nourrissons. **Dans ce cas, toujours utiliser la cuillère mesure fournie avec le flacon. Après ouverture, le flacon se conserve 1 mois à température ambiante (notez la date d'ouverture sur le flacon).**

• **Ce médicament doit être pris de préférence au cours des repas.**

Ce médicament est contre-indiqué chez les personnes souffrant d'un déficit en glucose-6-phosphate-déshydrogénase (G6PD), avant 6 semaines de vie, ou en cas d'association avec du Méthotrexate.

SOURCES :

E.Pilly 2020, 27e édition
www.santepubliquefrance.fr
ameli.fr

Résumé des Caractéristiques du
Produit

EFFETS INDÉSIRABLES

Certains effets indésirables sont susceptibles d'apparaître en cours de traitement.

Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Réactions cutanées		Ne stoppez pas votre traitement seul. Prévenez au plus vite votre médecin
Nausées/ Vomissements	Prenez votre traitement pendant le repas. Faites des petits repas en prenant votre temps. Choisissez des aliments peu odorants	Si ces conseils ne suffisent pas, demandez conseil à votre pharmacien
Troubles hématologiques		Il est nécessaire d'avoir une surveillance hématologique en cas de traitement prolongé
Troubles hépatiques		Il est nécessaire d'avoir une surveillance hépatique en cas de traitement prolongé

CONSEILS

- Ne **pas interrompre votre traitement avant la fin prévue** par le médecin.
- Ne prenez **pas de dose double pour compenser une dose oubliée**. Si vous avez oublié une dose attendre la prochaine heure de prise normale pour continuer le traitement.
- Si vous avez **vomi dans l'heure** qui suit la prise du traitement, vous pouvez **reprendre une dose** d'antibiotique.
- Si vous avez **vomi plus d'une heure après** la prise, ne pas reprendre l'antibiotique et **attendre la prise normale suivante**.
- Ne pas réutiliser un traitement antibiotique, même si vous pensez souffrir de symptômes identiques.
- Rapportez-les à votre pharmacien.
- Ce médicament est utilisable chez la femme enceinte, **après le premier trimestre de grossesse**. Il est contre-indiqué en cas d'allaitement.
- **Il est recommandé de boire abondamment (2L/jour) pendant le traitement** afin d'éviter la formation de cristaux dans les voies urinaires.



Copyright MedQual©
15/02/2024

CRATB MEDICAL