

CYCLINES



La famille des cyclines comporte plusieurs molécules telles que:

Doxycycline, Lymécycline, Tétracycline

Si vous avez présenté une allergie avérée à l'une d'entre elle, ne prenez pas une autre cycline

MODE D'EMPLOI

Indications principales : acné, rosacée, infections gynécologiques à Chlamydia, maladie de Lyme

Ces antibiotiques sont à prendre par **voie orale**, à jeun*, avec un grand verre d'eau non minéralisée sauf pour la **Doxycycline** qui peut se prendre au cours d'un repas ou avec un verre de lait.

La **Doxycycline** est utilisée en prophylaxie du paludisme : à prendre la veille du départ et jusqu'à 4 semaines après le retour de voyage en complément des mesures barrières (moustiquaires imprégnées et répulsifs cutanés)

La **Tétracycline** n'est plus commercialisée seule, elle est retrouvée dans la spécialité **Pylera**®

La **Minocycline** nécessite une prescription hospitalière à cause du risque de «DRESS syndrom», réaction allergique cutanée sévère.

*à heure régulière, 1 heure avant ou 2 heure après le repas,

SOURCES :
E.Pilly 2020, 27e édition
Base de données publique des médicaments

ameli.fr

EFFETS INDÉSIRABLES

Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
<u>Dyschromies dentaires</u> <u>hypoplasie de l'émail</u>	Contre-indiqués pendant la grossesse et chez les enfants de moins de 8 ans	
<u>Troubles digestifs</u> <u>(vomissements, et ulcérations œsophagiennes)</u>	Prenez votre médicament moins 1 heure avant de vous coucher et en position verticale (debout ou assis)	
<u>Photosensibilité</u>	Evitez toute exposition au soleil ou en cabines de bronzage. En cas d'exposition, portez toujours des vêtements longs et utilisez efficacement une crème solaire	Prévenez votre pharmacien en cas de projet de vacances au soleil. Prévenez votre médecin en cas d'apparition d'effets cutanés
<u>Vertiges, ataxie</u> (troubles de la coordination)		Prévenez votre pharmacien et votre médecin
<u>Réaction cutanées sévères</u>		Il peut s'agir d'une manifestation allergique , contactez votre médecin ou votre pharmacien

CONSEILS

- La consommation d'alcool peut **réduire l'efficacité** des Tétracyclines
- Pas de **consommation concomitante** de calcium, aluminium, magnésium et d'antiacides en cas de prise orale à cause du risque de **diminution de l'absorption** des cyclines à l'exception de la Doxycycline.
- Ne pas s'allonger** ou se coucher dans l'heure qui suit la prise du médicament afin d'éviter le risque d'ulcères œsophagiens.
- Ne **pas réutiliser** un traitement antibiotique même si vous pensez souffrir de symptômes identiques,
- Rapportez les médicaments non utilisés à votre pharmacien afin d'éviter que les antibiotiques ne se retrouvent dans l'environnement. Il dispose d'une filière spécifique de traitement des médicaments usagés Cyclamed®).
- Toutes les molécules de cette classe ne sont pas compatibles avec **la grossesse ou l'allaitement**, demandez conseil à votre pharmacien.
- Ces médicaments sont **contre-indiqués** avec les vitamines A et ses dérivés (rétinoïdes) et **déconseillés** avec les psoralènes.
- La posologie et la durée du traitement **doivent être respectées**, même si l'infection semble avoir disparue
- Les cyclines **majorent l'action des AVK** par modification du microbiote intestinal, Nécessité de surveillance rapprochée de l'INR et du risque hémorragique.

Copyright MedQual©
11/04/2024

