

MACROLIDES

La famille des macrolides comporte plusieurs molécules :

**Clarithromycine, Erythromycine, Roxithromycine
Azithromycine et Spiramycine.**

En cas d'allergie avérée à l'un des cyclines, restez prudent lors de la prise de tout autre cycline.



MODE D'EMPLOI

Indications principales: angines aiguës à streptocoques, infections bucco-dentaires, exacerbations de bronchites chroniques, coqueluche, pneumopathies à bactéries intracellulaires, ulcères (gastriques ou duodénaux), urétrites ou cervicites, toxoplasmose (liste non exhaustive)

Ces antibiotiques sont à prendre par **voie orale**. L'**érythromycine** et la **Roxithromycine** doivent être pris **avant le repas** alors que la **Clarithromycine** doit être prise **durant les repas**.

Au vu de la demi-vie prolongée de l'**Azithromycine**, **une seule prise quotidienne** suffit à son efficacité.

Signalez à votre pharmacien les médicaments que vous pouvez prendre pendant la **même période** que l'antibiothérapie.

SOURCES :
E.Pilly 2020, 27e édition
www.lecrat.fr

EFFETS INDÉSIRABLES

Certains effets indésirables sont susceptibles d'apparaître au cours du traitement

Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Troubles digestifs	Prenez votre traitement pendant le repas. Faites de petits repas en prenant votre temps	Si ces gestes ne suffisent pas, demandez conseil à votre pharmacien
Réactions cutanées		Il peut s'agir d'une manifestation allergique , contactez votre médecin ou votre pharmacien
Troubles Hépatiques		Il est nécessaire d'avoir une surveillance hépatique en cas de traitement prolongé
Augmentation de l'espace QT		Il est nécessaire d'avoir une surveillance cardiaque en cas de traitement prolongé
acouphènes / surdité		Il est nécessaire d'avoir un suivi ORL. Contactez votre médecin

CONSEILS

- Les Macrolides (excepté la Spiramycine) sont des **inhibiteurs enzymatiques** responsables d'interactions médicamenteuses:
 - Ne pas associer à la **Ciclosporine** ou au **Tacrolimus** car risque d'augmentation des taux sériques de ces médicaments et de leur toxicité.
- Association contre-indiquée** en cas de myasthénie (maladie neuromusculaire auto-immune)
- Association contre-indiquée** en cas de traitement concomitant avec la colchicine.
- Ne **pas réutiliser** un traitement antibiotique même si vous pensez souffrir de symptômes identiques,
- Rapportez les médicaments non utilisés à votre pharmacien afin d'éviter que les antibiotiques ne se retrouvent dans l'environnement. Il dispose d'une filière spécifique **de traitement des médicaments usagés** (Cyclamed).
- La posologie et la durée du traitement **doivent être respectées**, même si l'infection semble avoir disparue
- L'utilisation des macrolides est **possible** pendant **la grossesse** et pendant **l'allaitement**.

