

NITROFURANTOÏNE

NE PRENEZ PAS ce médicament si vous avez eu une réaction allergique à un autre antibiotique de la famille des *Nitrofuranes* ([Fiche allergie](#))




CE MÉDICAMENT NE CONVIENT PAS AU TRAITEMENT DES INFECTIONS URINAIRES DE L'HOMME



MODE D'EMPLOI

Ce médicament est un antibiotique de la famille des *Nitrofuranes*, utilisé dans le traitement des infections urinaires chez la femme.

Il est important de se conformer à la prescription médicale.



La posologie et la durée du traitement doivent être respectées, **même si l'infection semble avoir disparu.**

- **Les gélules doivent être avalées sans les ouvrir, avec un verre d'eau.**
- **Ce médicament doit être pris de préférence au cours des repas afin d'éviter d'éventuels troubles digestifs.**

Ce médicament est contre-indiqué chez les personnes souffrant d'un déficit en glucose-6-phosphate-déshydrogénase (G6PD).

SOURCES :

E.Pilly 2020, 27e édition
www.santepubliquefrance.fr
ameli.fr

Résumé des Caractéristiques du
Produit

EFFETS INDÉSIRABLES

Certains effets indésirables sont susceptibles d'apparaître en cours de traitement.

Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Diarrhées	Prenez votre traitement pendant les repas Évitez les salades, crudités, légumes crus ... Préférez les féculents comme le riz, pâtes, semoule	Pensez à vous hydrater correctement En cas de diarrhées importantes et persistantes, contactez votre médecin
Nausées/ Vomissements	Prenez votre traitement pendant le repas. Faites des petits repas en prenant votre temps. Choisissez des aliments peu odorants.	Si ces conseils ne suffisent pas, demandez conseil à votre pharmacien
Coloration brunâtre des urines		Ne pas s'inquiéter, il s'agit de troubles transitoires

CONSEILS

- Ne **pas interrompre votre traitement avant la fin prévue** par le médecin.
- Ne prenez **pas de dose double pour compenser une dose oubliée**. Si vous avez oublié une dose, attendre la prochaine heure de prise normale pour continuer le traitement.
- Si vous avez **vomi dans l'heure** qui suit la prise du traitement, vous pouvez **reprendre une dose** d'antibiotique.
- Si vous avez **vomi plus d'une heure après** la prise, ne pas reprendre l'antibiotique et **attendre la prise normale suivante**.
- Ne pas réutiliser un traitement antibiotique, même si vous pensez souffrir de symptômes identiques.
- Rapportez-les à votre pharmacien.
- Ce médicament est **utilisable sans restriction chez la femme enceinte**, sauf chez les femmes en toute fin de grossesse (travail ou accouchement).

