

# PIVMECILLINAM

**NE PRENEZ PAS** ce médicament si vous avez eu une réaction allergique à un autre antibiotique de la famille des *Pénicillines* ([Fiche allergie](#))



**CE MÉDICAMENT EST CONTRE INDIQUÉ EN CAS DE MONONUCLEOSE INFECTIEUSE**



## MODE D'EMPLOI

Ce médicament est un antibiotique de la famille des *Amidinopénicillines*, utilisé dans le traitement de diverses infections bactériennes.

**Il est important de se conformer à la prescription médicale**



Ce médicament est **réservé à l'adulte**, il n'est pas adapté à l'enfant.

La posologie et la durée du traitement doivent être respectées, **même si l'infection semble avoir disparu**.

- **Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau en position assise ou debout. Ne pas s'allonger dans la demi-heure suivant la prise.**
- **Ce médicament doit être pris de préférence au cours des repas afin d'éviter d'éventuels troubles digestifs.**



### SOURCES :

E.Pilly 2020, 27e édition  
www.santepubliquefrance.fr  
ameli.fr

Résumé des Caractéristiques du  
Produit

## EFFETS INDÉSIRABLES

Certains effets indésirables sont susceptibles d'apparaître en cours de traitement.

Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Diarrhées	Prenez votre traitement pendant les repas. Évitez les salades, crudités, légumes crus ... Préférez les féculents comme le riz, pâtes, semoule	Pensez à vous hydrater correctement En cas de diarrhées importantes et persistantes, contactez votre médecin
Nausées/ Vomissements	Prenez votre traitement pendant le repas. Faites des petits repas en prenant votre temps. Choisissez des aliments peu odorants	Si ces conseils ne suffisent pas, demandez conseil à votre pharmacien
Eruptions cutanées	Pensez à signaler que vous êtes traités par Allopurinol. Il peut induire en association avec ce médicament des éruptions cutanées.	Ne pas arrêter les traitements seuls, prévenir au plus tôt un médecin.

## CONSEILS

- Ne **pas interrompre votre traitement avant la fin prévue** par le médecin.
- Ne prenez **pas de dose double pour compenser une dose oubliée**. Si vous avez oublié une dose attendez la prochaine heure de prise normale pour continuer le traitement.
- Si vous avez **vomi dans l'heure** qui suit la prise du traitement, vous pouvez **reprendre une dose** d'antibiotique.
- Si vous avez **vomi plus d'une heure après** la prise, ne pas reprendre l'antibiotique et **attendre la prise normale suivante**.
- Ne pas réutiliser un traitement antibiotique, même si vous pensez souffrir de symptômes identiques.
- Rapportez-les à votre pharmacien.
- Ce médicament est **utilisable sans restriction chez la femme enceinte**, sauf chez les femmes en toute fin de grossesse (travail ou accouchement).



Copyright MedQual©  
15/02/2024

**CRATB** MEDICAL  
PROVISE LA SAINTE