

# AMOXICILLINE / ACIDE CLAVULANIQUE



**NE PRENEZ PAS** ce médicament si vous avez eu une réaction allergique à un autre antibiotique de la famille des *Pénicillines* ([Fiche allergie](#))

## MODE D'EMPLOI

Ce médicament est une association entre un antibiotique, l'**Amoxicilline** (famille des *Pénicillines*) et de l'**Acide clavulanique** qui vient renforcer l'effet de l'Amoxicilline.

**Il est important de se conformer à la prescription médicale.**

La posologie et la durée du traitement doivent être respectées, **même si l'infection semble avoir disparu.**



• Les **comprimés** doivent être pris par voie orale accompagnés d'un grand verre d'eau. Ils ne doivent pas être écrasés, coupés ou croqués



• **Sachet-dose** : contenu à disperser dans un verre d'eau avant ingestion par voie orale.



• **Flacon à reconstituer (enfants uniquement)** : La dose par prise (selon le poids de l'enfant) est indiquée sur la pipette graduée en kg. Après la reconstitution, un flacon se garde au **maximum 7j au réfrigérateur** (notez la date d'ouverture sur le flacon).

**Le médicament doit toujours être pris en début ou milieu de repas afin d'améliorer la tolérance gastro-intestinale.**



## EFFETS INDÉSIRABLES

Certains effets indésirables sont susceptibles d'apparaître en cours de traitement.

| Effets indésirables                                 | Prévention  | Conduite à tenir  |
|---|---|---|
| Diarrhées   | Prenez votre traitement pendant les repas ou avec une collation. Evitez les salades, crudités et consommez des féculents (riz blanc, pâtes ...) | En cas de diarrhées importantes et persistantes, accompagnées de douleurs abdominales et de fièvre, contactez votre médecin |
| Nausées/<br>Vomissements                            | Prenez votre traitement pendant le repas. Faites de petits repas en prenant votre temps   | Si ces gestes ne suffisent pas, demandez conseil à votre pharmacien   |
| Infections vaginales                                |   | Contactez votre médecin si ces symptômes persistent   |
| Démangeaisons généralisées et/ou éruptions cutanées |   | <b>Il peut s'agir d'une manifestation allergique, contactez votre médecin</b>   |

## CONSEILS

- Ne **pas interrompre votre traitement avant la fin prévue** par le médecin.
- Ne prenez **pas de dose double pour compenser une dose oubliée**. Si vous avez oublié une dose, attendre la prochaine heure de prise normale pour continuer le traitement.
- Si vous avez **vomi dans l'heure** qui suit la prise du traitement, vous pouvez **reprendre une dose** d'antibiotique.
- Si vous avez **vomi plus d'une heure après** la prise, ne pas reprendre l'antibiotique et **attendre la prise normale suivante**.
- Ne pas réutiliser un traitement antibiotique, même si vous pensez souffrir de symptômes identiques.
- Rappelez les médicaments non utilisés à votre pharmacien. Il a à sa disposition une **filière spécifique de traitement des médicaments usagés**.
- Le médicament est utilisable **sans restriction chez la femme enceinte**. Son utilisation est également **possible chez la femme allaitante**, sauf si l'enfant présente une allergie avérée aux pénicillines.

