


AMOXICILLINE

 **NE PRENEZ PAS** ce médicament si vous avez eu une réaction allergique à un autre antibiotique de la famille des *Pénicillines* ([Fiche allergie](#))

MODE D'EMPLOI

Ce médicament est un antibiotique de la famille des *Pénicillines*, utilisé dans le traitement de nombreuses infections.

Il est important de se conformer à la prescription médicale.



La posologie et la durée du traitement doivent être respectées, même si l'infection semble avoir disparu.

- Les comprimés peuvent être pris par voie orale accompagnés d'un verre d'eau ou dispersés dans de l'eau.
- Les gélules doivent être avalées sans les ouvrir, avec un verre d'eau.
- Poudre pour suspension buvable : Conservation 14j maximum (notez la date d'ouverture sur le flacon). Toujours utiliser la cuillère-mesure fournie avec le flacon pour mesurer la dose à délivrer. Remplir la cuillère-mesure jusqu'au bord et la laver après chaque usage.

Le médicament doit toujours être pris en début ou milieu de repas afin d'améliorer la tolérance gastro-intestinale.



SOURCES :
E.Pilly 2020, 27e édition
www.santepubliquefrance.fr

Ameli.fr
Résumé des Caractéristiques du
Produit

EFFETS INDÉSIRABLES

Certains effets indésirables sont susceptibles d'apparaître en cours de traitement.

Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Diarrhées	Prenez votre traitement pendant les repas ou avec une collation. Evitez les salades, crudités et consommez des féculents (riz blanc, pâtes ...)	En cas de diarrhées importantes et persistantes, accompagnées de douleurs abdominales et de fièvre, contactez votre médecin
Nausées/ Vomissements	Prenez votre traitement pendant le repas. Faites de petits repas en prenant votre temps	Si ces gestes ne suffisent pas, demandez conseil à votre pharmacien
Infections vaginales		Contactez votre médecin si ces symptômes persistent
Démangeaisons généralisées et/ou éruptions cutanées		Il peut s'agir d'une manifestation allergique, contactez votre médecin

CONSEILS

- Ne pas interrompre votre traitement avant la fin prévue par le médecin.
- Ne prenez pas de dose double pour compenser une dose oubliée. Si vous avez oublié une dose attendre la prochaine heure de prise normale pour continuer le traitement.
- Si vous avez vomis dans l'heure qui suit la prise du traitement, vous pouvez reprendre une dose d'antibiotique.
- Si vous avez vomis plus d'une heure après la prise, ne pas reprendre l'antibiotique et attendre la prise normale suivante.
- Ne pas réutiliser un traitement antibiotique, même si vous pensez souffrir de symptômes identiques.
- Rapportez les médicaments non utilisés à votre pharmacien. Il a à sa disposition une filière spécifique de traitement des médicaments usagés.
- Le médicament est utilisable sans restriction chez la femme enceinte. Son utilisation est également possible chez la femme allaitante, sauf si l'enfant présente une allergie avérée aux pénicillines.



Copyright MedQual©
10/04/2024

CRATB MEDICAL
PREVENT LA 2024