


# CÉPHALOSPORINES DE 3<sup>ÈME</sup> GÉNÉRATION

Céfixime, Cefpodoxime, Ceftriaxone




 **NE PRENEZ PAS** ce médicament si vous avez eu une réaction allergique à un autre antibiotique de la famille des *Céphalosporines* ([Fiche allergie](#))


## MODE D'EMPLOI

Ce médicament est un antibiotique de la famille des *Céphalosporines*, utilisé dans le traitement des infections.

Il est important de se conformer à la prescription médicale. 

La posologie et la durée du traitement doivent être respectées, même si l'infection semble avoir disparu.

-  Les comprimés doivent être pris par voie orale accompagnés d'un verre d'eau.
-  Poudre pour suspension buvable (Céfixime, cefpodoxime) : Conservation 10j maximum (notez la date d'ouverture sur le flacon). La dose par prise est indiquée, en fonction du poids, sur le piston de la pipette graduée en kg. **Toujours utiliser la pipette fournie avec le flacon.** Bien agiter le flacon avant chaque prise.
-  Granule pour suspension buvable (Cefpodoxime) : Conservation 10j maximum au réfrigérateur (notez la date d'ouverture sur le flacon). La dose par prise est indiquée, en fonction du poids, sur le manche de la cuillère graduée en kg. Bien agiter le flacon avant chaque prise.

Le médicament doit de préférence être pris en début ou milieu de repas afin d'améliorer la tolérance gastro-intestinale. 

SOURCES :  
E.Pilly 2020, 27e édition  
[www.santepubliquefrance.fr](http://www.santepubliquefrance.fr)

ameli.fr  
Résumé des Caractéristiques du  
Produit

## EFFETS INDÉSIRABLES

Certains effets indésirables sont susceptibles d'apparaître en cours de traitement.

Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Diarrhées	Prenez votre traitement pendant les repas ou avec une collation. Evitez les salades, crudités et consommez des féculents (riz blanc, pâtes ...)	En cas de diarrhées importantes et persistantes, accompagnées de douleurs abdominales et de fièvre, contactez votre médecin
Anomalie de la Numération Formule Sanguine, Augmentation des transaminases		Ne pas s'inquiéter, il s'agit d'effets indésirables transitoires
Démangeaisons généralisées et/ou éruption cutanée	Pensez à toujours signaler des antécédents d'allergie à une céphalosporine et/ou une pénicilline	Il peut s'agir d'une manifestation allergique, contactez votre médecin

## CONSEILS

- Ne pas interrompre votre traitement avant la fin prévue par le médecin.
- Ne prenez pas de dose double pour compenser une dose oubliée. Si vous avez oublié une dose attendre la prochaine heure de prise normale pour continuer le traitement.
- Si vous avez **vomi dans l'heure** qui suit la prise du traitement, vous pouvez reprendre une dose d'antibiotique.
- Si vous avez **vomi plus d'une heure après** la prise, ne pas reprendre l'antibiotique et attendre la prise normale suivante.
- Ne pas réutiliser un traitement antibiotique, même si vous pensez souffrir de symptômes identiques.
- Rapportez-les à votre pharmacien. Il a à sa disposition une filière spécifique de traitement des médicaments usagés.
- Ces médicaments sont utilisables sans restriction chez les femmes enceintes. Leur utilisation est également possible chez les femmes allaitantes, si l'enfant n'est pas allergique aux bêta-lactamines.



Copyright MedQual©  
10/04/2024

**CRATB** MEDICAL 