

FLUOROQUINOLONES

Norfloxacine, Ofloxacine, Ciprofloxacine,
Lévofloxacine, Moxifloxacine



NE PRENEZ PAS ce médicament si vous avez eu une réaction allergique à un autre antibiotique de la famille des *Fluoroquinolones* ([Fiche allergie](#))

MODE D'EMPLOI

Ces médicaments sont des antibiotiques de la famille des *Fluoroquinolones*, qui peuvent être utilisés lors **d'infections bactériennes graves**.

La posologie et la durée du traitement doivent être respectées, **même si l'infection semble avoir disparu**.



- Les **comprimés** doivent être pris par voie orale accompagnés d'un verre d'eau **sans être coupés ou croqués**. Attention, pour la **Ciprofloxacine** et la **Norfloxacine**, les comprimés ne doivent **pas être pris** avec des **produits laitiers** ou **d'autres boissons riches en calcium**.



- Le flacon de **suspension buvable** (Ciflox®) doit être bien **agité pendant 15s avant chaque prise**. Une fois reconstitué, le flacon se conserve 14j (notez la date d'ouverture sur le flacon). Toujours utiliser la cuillère-mesure fournie avec le flacon pour obtenir une mesure précise.



- Ces médicaments doivent être pris au moins **2h avant ou 4h après** la prise de **sels de fer, zinc, antiacides à base de magnésium, aluminium ou sucralfate**, pour éviter une moindre efficacité.

SOURCES :
E.Pilly 2020, 27e édition
Résumé des Caractéristiques du
Produit

ansm.santé.fr

EFFETS INDÉSIRABLES

Certains effets indésirables sont susceptibles d'apparaître au cours du traitement

Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Tendinopathies	Pensez à prévenir votre médecin si vous avez une activité physique soutenue ou si vous prenez un traitement prolongé par corticoïdes	Toute douleur ou gonflement évoquant une tendinite doivent vous conduire à consulter votre médecin en urgence. Les lésions tendineuses peuvent survenir des premiers jours de traitement jusqu'à plusieurs mois après l'arrêt
Photosensibilité	Évitez toute exposition au soleil ou en cabines de bronzage. En cas d'exposition, portez toujours des vêtements longs et utilisez efficacement une crème solaire	Prévenez votre pharmacien en cas de projet de vacances au soleil. Prévenez votre médecin en cas d'apparition d'effets cutanés
Troubles cardiaques et cardio-vasculaires	Pensez à prévenir votre médecin si vous avez des antécédents personnels ou familiaux de maladie anévrysmale ou de valvulopathie cardiaque	Contactez en urgence votre médecin en cas de palpitations , de sensations de battements du cœur irréguliers ou rapides , de difficultés à respirer ou de gonflement des jambes En cas de douleurs dorsale, thoracique ou abdominale soudaine , contactez les urgences

CONSEILS

- La prise de **Fluoroquinolones** est déconseillée en cas de traitement antérieur dans les **6 derniers mois**.
- Ne prenez **pas de dose double pour compenser une dose oubliée**. Si vous avez oublié une dose attendre la prochaine heure de prise normale pour continuer le traitement.
- Si vous avez **vomi dans l'heure** qui suit la prise du traitement, vous pouvez **reprendre une dose** d'antibiotique.
- Si vous avez **vomi plus d'une heure après** la prise, ne pas reprendre l'antibiotique et **attendre la prise normale suivante**.
- Ne pas réutiliser un traitement antibiotique, même si vous pensez souffrir de symptômes identiques.
- Rapportez les médicaments non utilisés à votre pharmacien afin d'éviter que les antibiotiques ne se retrouvent dans l'environnement. Il dispose d'une **filière spécifique de traitement des médicaments usagés** (Cyclamed©)
- Toutes les molécules de cette classe ne sont pas compatibles avec la grossesse** ou l'allaitement, **demandez conseil à votre pharmacien**.



CYCLA MED \leftrightarrow
TRIER, APPORTER, PRÉSERVER



Copyright MedQual©
09/04/2024

CRATB MEDICAL ∞
PREVENT LA DURE