

FOSFOMYCINE



Si les symptômes persistent plus de 3 jours malgré la prise du traitement, recontactez votre médecin.

MODE D'EMPLOI

Ce médicament est un antibiotique, utilisé principalement dans le traitement des infections urinaires non compliquées de la femme.

Il est important de se conformer à la prescription médicale.

La posologie et la durée du traitement doivent être respectées, même si l'infection semble avoir disparu. Dans le cas contraire, l'infection peut réapparaître.

Il s'agit d'un traitement monodose, une prise unique de ce médicament suffit.

Le médicament se présente sous la forme de granulés pour solution buvable. Dissoudre le contenu du sachet de granulés dans un demi-verre d'eau et boire le mélange.

Ce médicament doit être pris à distance des repas, soit 2 à 3 heures avant ou après les repas car les aliments réduisent l'absorption digestive de ce médicament.

Le médicament est éliminé dans les urines sous forme active. Dans des indications d'infection urinaire, le traitement doit être pris de préférence après une vidange urinaire et avant le coucher pour maximiser le temps de présence dans la vessie.

EFFETS INDÉSIRABLES

Certains effets indésirables sont susceptibles d'apparaître en cours de traitement.

Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Diarrhées	Pensez à bien vous hydrater. Evitez les salades, crudités et consommez des féculents (riz blanc, pâtes ...)	Ne pas s'inquiéter, il s'agit d'effets indésirables transitoires
Nausées	Buvez des petites quantités de façon répétée, Prenez des repas légers (plutôt froids) de façon rapprochée	Ne pas s'inquiéter, il s'agit d'effets indésirables transitoires
Démangeaisons généralisées et/ou éruption cutanée	Pensez à toujours signaler des antécédents d'allergie à une Céphalosporine et/ou une Pénicilline	Il peut s'agir d'une manifestation allergique, contactez votre médecin

CONSEILS

- Ne pas interrompre votre traitement avant la fin prévue par le médecin.
- Ne prenez pas de dose double pour compenser une dose oubliée. Si vous avez oublié une dose attendre la prochaine heure de prise normale pour continuer le traitement.
- Si vous avez vomi dans l'heure qui suit la prise du traitement, vous pouvez reprendre une dose d'antibiotique.
- Si vous avez vomi plus d'une heure après la prise, ne pas reprendre l'antibiotique et attendre la prise normale suivante.
- Ne pas réutiliser un traitement antibiotique, même si vous pensez souffrir de symptômes identiques.
- Rapportez les médicaments non utilisés à votre pharmacien. Il a à sa disposition une filière spécifique de traitement des médicaments usagés.
- Buvez beaucoup, dès l'apparition des premiers symptômes. Urinez souvent et videz bien votre vessie.
- Ce médicament est utilisable sans restriction chez les femmes enceintes et allaitantes.