

# IMIDAZOLÉS

La famille des imidazolés comporte plusieurs molécules telles que :

Métronidazole, Ornidazole, Tinidazole et Secnidazole



**Ne prenez pas ce médicament si vous avez déjà eu une réaction allergique à un des antibiotiques de la même famille.**

## MODE D'EMPLOI

Ce sont des antibiotiques **anti-infectieux, antibactériens et antiparasitaires.**

**Indications :** infections à bactéries anaérobies strictes, amébose intestinale et hépatique, lambliose, vaginose bactérienne, trichomonose et éradication d'*Helicobacter pylori*.

Ils sont administrés par **voie orale ou topique**. La voie **veineuse** est réservée aux infections graves, à l'antibioprophylaxie chirurgicale ou en cas d'impossibilité d'utilisation de la voie orale.

Ils sont bien tolérés et ont une bonne biodisponibilité.

Le Métronidazole a une **demi-vie courte** ce qui nécessite **plusieurs administrations quotidiennes** contrairement aux autres qui ont une **demi-vie plus longue** et dont **une seule administration quotidienne** est suffisante.

## EFFETS INDÉSIRABLES



**Certains effets indésirables sont susceptibles d'apparaître au cours du traitement**

Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Goût métallique (troubles digestifs mineurs)		
Effet antabuse (nausées, rougeurs, chute de tension...)	Ne pas consommer d'alcool pendant le traitement	
Réaction d'hypersensibilité		Il peut s'agir d'une <b>manifestation allergique</b> , contactez votre médecin ou votre pharmacien
leucopénie		Il est nécessaire d'avoir une surveillance hématologique en cas de traitement prolongé
Neuropathie sensitive		Contactez votre médecin

## CONSEILS

- **Espacer les doses** chez les insuffisants rénaux et hépatiques.
- Contre-indiqués en cas d'**hypersensibilité** aux nitro-imidazolés.
- Leur utilisation conjointe avec les antivitamines K peut entraîner la **potentialisation de ces derniers**.
- La posologie et la durée de l'antibiothérapie doivent être respectées **même si l'infection semble avoir cessé**. Dans le cas contraire l'infection peut réapparaître.
- Ne pas réutiliser un traitement antibiotique, **même si vous pensez souffrir de symptômes identiques**.
- Rappelez les médicaments non utilisés à votre pharmacien afin d'éviter que les antibiotiques ne se retrouvent dans l'environnement. Il dispose d'une filière **spécifique de traitement des médicaments usagés** (Cyclamed®).
- En cas de grossesse ou d'allaitement, on privilégiera le **métronidazole**, mieux évalué.
- L'utilisation de métronidazole est **possible pendant la grossesse**. Son utilisation est **possible pour une durée inférieure à 14 jours chez la femme allaitante**.

