

# NITROFURANTOÏNE

**NE PRENEZ PAS** ce médicament si vous avez eu une réaction allergique à un autre antibiotique de la famille des *Nitrofuranes* ([Fiche allergie](#))



**CE MÉDICAMENT NE CONVIENT PAS AU TRAITEMENT DES INFECTIONS URINAIRES DE L'HOMME**



## MODE D'EMPLOI

Ce médicament est un antibiotique de la famille des *Nitrofuranes*, utilisé dans le traitement des infections urinaires chez la femme.

**Il est important de se conformer à la prescription médicale.**



La posologie et la durée du traitement doivent être respectées, **même si l'infection semble avoir disparu.**

- **Les gélules doivent être avalées sans les ouvrir, avec un verre d'eau.**
- **Ce médicament doit être pris de préférence au cours des repas afin d'éviter d'éventuels troubles digestifs.**

Ce médicament est contre-indiqué chez les personnes souffrant d'un déficit en glucose-6-phosphate-déshydrogénase (G6PD).

### SOURCES :

E.Pilly 2020, 27e édition  
www.santepubliquefrance.fr  
ameli.fr

Résumé des Caractéristiques du  
Produit

## EFFETS INDÉSIRABLES

Certains effets indésirables sont susceptibles d'apparaître en cours de traitement.

Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Diarrhées	Prenez votre traitement pendant les repas Évitez les salades, crudités, légumes crus ... Préférez les féculents comme le riz, pâtes, semoule	Pensez à vous hydrater correctement En cas de diarrhées importantes et persistantes, contactez votre médecin
Nausées/ Vomissements	Prenez votre traitement pendant le repas. Faites des petits repas en prenant votre temps. Choisissez des aliments peu odorants.	Si ces conseils ne suffisent pas, demandez conseil à votre pharmacien
Coloration brunâtre des urines		Ne pas s'inquiéter, il s'agit de troubles transitoires

## CONSEILS

- Ne **pas interrompre votre traitement avant la fin prévue** par le médecin.
- Ne prenez **pas de dose double pour compenser une dose oubliée**. Si vous avez oublié une dose, attendre la prochaine heure de prise normale pour continuer le traitement.
- Si vous avez **vomi dans l'heure** qui suit la prise du traitement, vous pouvez **reprendre une dose** d'antibiotique.
- Si vous avez **vomi plus d'une heure après** la prise, ne pas reprendre l'antibiotique et **attendre la prise normale suivante**.
- Ne pas réutiliser un traitement antibiotique, même si vous pensez souffrir de symptômes identiques.
- Rapportez-les à votre pharmacien.
- Ce médicament est **utilisable chez la femme enceinte** selon le résultat de l'ECBU. Il est également **utilisable chez la femme allaitante sauf si l'enfant présente un déficit en G6PD**.

