

PIVMECILLINAM

NE PRENEZ PAS ce médicament si vous avez eu une réaction allergique à un autre antibiotique de la famille



des *Pénicillines* ([Fiche allergie](#))

CE MÉDICAMENT EST CONTRE INDIQUÉ EN CAS DE MONONUCLEOSE INFECTIEUSE



MODE D'EMPLOI

Ce médicament est un antibiotique de la famille des *Amidinopénicillines*, utilisé dans le traitement de diverses infections bactériennes.

Il est important de se conformer à la prescription médicale



Ce médicament est **réservé à l'adulte**, il n'est pas adapté à l'enfant.

La posologie et la durée du traitement doivent être respectées, **même si l'infection semble avoir disparu**.

- **Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau en position assise ou debout. Ne pas s'allonger dans la demi-heure suivant la prise.**
- **Ce médicament doit être pris de préférence au cours des repas afin d'éviter d'éventuels troubles digestifs.**



SOURCES :

E.Pilly 2020, 27e édition
www.santepubliquefrance.fr
ameli.fr

Résumé des Caractéristiques du
Produit

EFFETS INDÉSIRABLES

Certains effets indésirables sont susceptibles d'apparaître en cours de traitement.

Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Diarrhées	Prenez votre traitement pendant les repas. Évitez les salades, crudités, légumes crus ... Préférez les féculents comme le riz, pâtes, semoule	Pensez à vous hydrater correctement En cas de diarrhées importantes et persistantes, contactez votre médecin
Nausées/ Vomissements	Prenez votre traitement pendant le repas. Faites des petits repas en prenant votre temps. Choisissez des aliments peu odorants	Si ces conseils ne suffisent pas, demandez conseil à votre pharmacien
Eruptions cutanées	Pensez à signaler que vous êtes traités par Allopurinol. Il peut induire en association avec ce médicament des éruptions cutanées.	Ne pas arrêter les traitements seuls, prévenir au plus tôt un médecin.

CONSEILS

- Ne **pas interrompre votre traitement avant la fin prévue** par le médecin.
- Ne prenez **pas de dose double pour compenser une dose oubliée**. Si vous avez oublié une dose attendre la prochaine heure de prise normale pour continuer le traitement.
- Si vous avez **vomi dans l'heure** qui suit la prise du traitement, vous pouvez **reprendre une dose** d'antibiotique.
- Si vous avez **vomi plus d'une heure après** la prise, ne pas reprendre l'antibiotique et **attendre la prise normale suivante**.
- Ne pas réutiliser un traitement antibiotique, même si vous pensez souffrir de symptômes identiques.
- Rapportez-les à votre pharmacien.
- Ce médicament est **utilisable sans restriction chez la femme enceinte**. Son utilisation est également **possible chez la femme allaitante**, à condition que l'enfant ne présente pas d'allergie avérée aux pénicillines.

