

PRISTINAMYCINE

La **Pristinamycine** est le seul antibiotique retrouvé dans la famille des **Synergistines**

 **Ne prenez pas ce médicament si vous avez déjà présenté une réaction allergique à cet antibiotique**

MODE D'EMPLOI

La Pristinamycine est **proche des Macrolides** mais possède une **meilleure activité** sur les staphylocoques, pneumocoques, streptocoques.

Indications : Infections cutanées (impétigo, dermohypodermite bactérienne), exacerbations de bronchopneumopathie chronique obstructive, pneumonies communautaires, sinusites maxillaires aiguës.

EFFETS INDÉSIRABLES



Certains effets indésirables sont susceptibles d'apparaître au cours du traitement

Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Troubles digestifs	À prendre au cours des repas	
Allergies cutanées		Il peut s'agir d'une manifestation allergique , contactez votre médecin

CONSEILS

- Association contre-indiquée avec la **Colchicine**.
- Interaction médicamenteuse avec la **Ciclosporine** : augmentation des taux de créatinémie et de ciclosporine, à surveiller par des dosages sanguins.
- Interaction médicamenteuse avec les **Antivitamines K** : surveillance rapprochée de l'INR
- La posologie et la durée de l'antibiothérapie doivent être respectées **même si l'infection semble avoir cessé**. Dans le cas contraire l'infection peut réapparaître.
- Ne pas réutiliser un traitement antibiotique, **même si vous pensez souffrir de symptômes identiques**.
- Rapportez les médicaments non utilisés à votre pharmacien afin d'éviter que les antibiotiques ne se retrouvent dans l'environnement. Il dispose d'une filière spécifique de **traitement des médicaments usagés** (Cyclamed®).
- **Contre-indiqué** en cas **d'hypersensibilité** ou **d'intolérance au gluten**.
- L'utilisation de **pristinamycine est possible pendant la grossesse**. Pendant **l'allaitement**, on préférera une autre molécule, un traitement d'une **durée inférieure à 14 jours** est cependant possible.

