

RIFAMPICINE

NE PRENEZ PAS ce médicament si vous avez présenté une réaction allergique à la rifabutine ou la rifampicine



([Fiche allergie](#))

CE MEDICAMENT PROVOQUE DE NOMBREUSES INTERACTIONS AVEC D'AUTRES TRAITEMENTS, PRECISEZ VOS TRAITEMENTS HABITUELS A VOTRE PHARMACIEN.



MODE D'EMPLOI

Ce médicament est un antibiotique de la famille des *Rifamycines*, utilisé dans le traitement de votre infection.

- **Les gélules doivent être avalées sans les ouvrir, avec un verre d'eau.**
- **Ce médicament doit être pris de préférence A JEUN pour une meilleure efficacité.**

Si des effets indésirables apparaissent suite à la prise de cet antibiotique, vous pouvez en informer le **centre de Pharmacovigilance** de votre région

[Liste des Centres Régionaux de Pharmacovigilance \(CRPV\)](#)
- [ANSM \(sante.fr\)](#)



SOURCES :
E.Pilly 2020, 27e édition
www.santepubliquefrance.fr
ameli.fr

Résumé des Caractéristiques du
Produit

EFFETS INDÉSIRABLES



Certains effets indésirables sont susceptibles d'apparaître au cours du traitement

Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Coloration des sécrétions oculaires en rouge/orangé	Evitez le port de lentilles de contact	
Nausées/ Vomissements	Faites des petits repas en prenant votre temps. Choisissez des aliments peu odorants.	Si ces conseils ne suffisent pas, demandez conseil à votre pharmacien
Maux de têtes/ Etourdissements	Levez-vous lentement après avoir été assis ou couché. Évitez les mouvements qui peuvent déclencher l'étourdissement Pour les maux de têtes, des antidouleurs (type Paracétamol) peuvent être nécessaires	Si ces symptômes persistent, parlez-en à votre médecin

CONSEILS

- Ne prenez **pas de dose double pour compenser une dose oubliée**. Si vous avez oublié une dose, attendre la prochaine heure de prise normale pour continuer le traitement.
- Si vous avez **vomi dans l'heure** qui suit la prise du traitement, vous pouvez **reprendre une dose** d'antibiotique.
- Si vous avez **vomi plus d'une heure après** la prise, ne pas reprendre l'antibiotique et **attendre la prise normale suivante**.
- La posologie et la durée de l'antibiothérapie doivent être respectées **même si l'infection semble avoir cessée**. Dans le cas contraire l'infection peut réapparaître.
- Ne pas réutiliser un traitement antibiotique, même si vous pensez souffrir de symptômes identiques.
- Rappelez les médicaments non utilisés à votre pharmacien. Il a à sa disposition une **filière spécifique de traitement des médicaments usagés**.
- Ce médicament est **utilisable chez la femme enceinte**. Il faudra cependant informer le soignant suivant la grossesse : dans le cas d'une prise en fin de grossesse, afin de prévoir la prise de vitamine K1. Son utilisation est possible pendant l'allaitement.