

OXAZOLIDINONES

La famille des oxazolidinones comporte plusieurs molécules telles que :

Linézolide et Tédizolide



Ne prenez pas ce médicament si vous avez déjà eu une réaction allergique à un de ces antibiotiques.

MODE D'EMPLOI

Ce sont des **antibiotiques bactériostatiques** (empêchant la croissance des bactéries), recommandés dans le traitement des **endocardites** et des **infections ostéoarticulaires** après avis d'un infectiologue.

Ces antibiotiques sont administrés par **voie orale** ou **intraveineuse**.

Du fait de sa demi-vie courte, le **Linézolide** nécessite une **administration biquotidienne** alors que le **Tédizolide** avec sa **demi-vie longue** ne nécessite **qu'une seule administration quotidienne**.

SOURCES :
E.Pilly 2020, 27e édition
www.santepubliquefrance.fr
www.who.int



EFFETS INDÉSIRABLES



Certains effets indésirables sont susceptibles d'apparaître au cours du traitement

Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Myélotoxicité	Fréquent lors des traitements de plus de 28 jours	Surveillance hebdomadaire de la NFS (numération formule sanguine)
Acidose lactique (<i>Linézolide</i>)	<ul style="list-style-type: none">- Boire beaucoup d'eau et la consommation excessive d'alcool- Réduire l'intensité des exercices physiques	<ul style="list-style-type: none">- Contactez votre médecin
neuropathies optiques ou périphériques (<i>Linézolide</i>)	Signaler tout trouble visuel en cours de traitement	Il est nécessaire d'avoir une surveillance ophtalmologique en cas de traitement prolongé
Syndrome sérotoninergique	Eviter l'association avec les autres médicaments sérotoninergiques	Consulter en cas de troubles cognitifs et de fièvre

CONSEILS

- Le Linézolide est un **inhibiteur de la monoamine oxydase**.
 - Il faut **éviter toute association** avec un **antidépresseur IMAO**.
- Contre-indiqué également avec les **médicaments sérotoninergiques** : tramadol, certains antidépresseurs (ISRS), triptans, pseudoéphédrine.
- Ne pas dépasser 28 jours de traitement par linézolide** en raison de la toxicité.
- Contre-indiqués** en cas de **grossesse** ou **d'allaitement**.
- Utilisation possible chez l'enfant et l'adolescent après **avis spécialisé**.
- La posologie et la durée de l'antibiothérapie doivent être respectées **même si l'infection semble avoir cessée**. Dans le cas contraire l'infection peut réapparaître.
- Ne pas réutiliser un traitement antibiotique, **même si vous pensez souffrir de symptômes identiques**.
- Rapportez les médicaments non utilisés à votre pharmacien afin d'éviter que les antibiotiques ne se retrouvent dans l'environnement. Il dispose d'une filière **spécifique de traitement des médicaments usagés** (Cyclamed).



Copyright MedQual©
09/04/2024

CRATB MEDICAL