

CHLAMYDIA

POINTS CLÉS



Infection Sexuellement Transmissible (IST) due à une bactérie appelée *Chlamydia trachomatis*.



Entre 2020 et 2021, le nombre d'infections à *Chlamydiae* déclarées dans le secteur privé a augmenté de 15%. C'est l'une des IST les plus fréquentes notamment chez les femmes âgées entre 15 et 24 ans et les hommes entre 20 et 30 ans.

DÉPISTAGE OU RECHERCHE

Cette IST étant souvent **asymptomatique** (60-70% des cas chez la femme vs 30% chez l'homme), le **dépistage** est fait en routine lors d'un dépistage IST complet.

En cas de **symptômes**, la recherche du germe doit être réalisée. Plusieurs types de symptomatologie :

- Chez la femme : pertes vaginales blanchâtres, brûlures urinaires et lors des rapports sexuels, saignements hors règles, douleurs pelviennes...
- Chez l'homme : écoulement pénien, brûlures urinaires, douleurs rectales et testiculaires...

EN PRATIQUE



Chez la femme : prélèvement avec pose de spéculum ou auto-prélèvement vaginal à l'aide d'un écouvillon placé dans son milieu de transport.

Chez l'homme : prélèvement du 1^e jet urinaire ou prélèvement urétral si signes cliniques.

GONOCOQUES

POINTS CLÉS



Infection Sexuellement Transmissible (IST) due à une bactérie appelée *Neisseria gonorrhoeae*.

Depuis 2016, le nombre d'infections à gonocoque déclarées est en augmentation continue. Cette infection est 2 fois plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. Les co-infections *Chlamydiae*/Gonocoque sont très courantes c'est pour cela que le dépistage est commun.

DÉPISTAGE OU RECHERCHE

Cette IST étant souvent **asymptomatique** (70% des cas chez la femme), le dépistage est fait en routine lors d'un dépistage IST complet.

En cas de symptômes, la recherche du germe doit être réalisée. Plusieurs types de symptomatologie :

- Chez la femme : douleurs pelviennes sourdes et durables, brûlures en urinant, pertes vaginales purulentes, douleurs rectales...
- Chez l'homme : écoulement purulent par le pénis ou le rectum (blennorragie), brûlures en urinant, démangeaisons du pénis, douleurs rectales et au niveau des testicules

Une recherche de *Chlamydia trachomatis* et de *Neisseria gonorrhoeae* peut aussi être faite au niveau de la gorge et/ou de l'anus notamment en cas de forme anorectale.

Il est important de notifier son/ses partenaires en cas de positivité afin de procéder au dépistage de ce/ces derniers.

Pour aller plus loin : **Ameli**

MYCOPLASMES GÉNITAUX

POINTS CLÉS



Bactéries transmises par voie sexuelle pouvant être présentes naturellement au niveau génital sans être pathogènes.

Chez l'homme, elles peuvent être responsables d'une inflammation de l'urètre, des testicules ou de la prostate. Chez la femme, les symptômes seront localisés au niveau vaginal, utérin ou des trompes.

INDICATIONS



La recherche des mycoplasmes génitaux est indiquée uniquement **si présence de symptômes** évocateurs et après élimination du diagnostic d'infection à *Chlamydiae* ou Gonocoque.

EN PRATIQUE



La recherche, **en cas de signes cliniques**, se base sur deux techniques différentes selon les types de mycoplasmes recherchés :

- *Mycoplasma hominis* et *Ureaplasma urealyticum* : **mise en culture** du prélèvement de type premier jet d'urine du matin, prélèvement vaginal, urétral, sperme...
- *Mycoplasma genitalium* : analyse **PCR** avec prélèvement du premier jet d'urine du matin ou prélèvement vaginal, urétral...

SOURCES :

E.Pilly 2020, 27e édition
chu-nantes.manuelprelevement.fr

Santé Publique France
Améli

Copyright MedQual©
07/09/2023

