

# VACCIN ROR

Rougeole – Oreillons - Rubéole

## CONTRE QUOI ?



### La Rougeole

La rougeole est l'une des maladies infectieuses les plus contagieuses. Elle se transmet par voie respiratoire et se caractérise par une forte **fièvre**, un **toux**, une **rhinite** et une **conjonctivite** importantes, puis par une **éruption cutanée**.

Complications : **Pneumonies** et **encéphalites** (inflammation du cerveau) qui peuvent laisser des **séquelles neurologiques graves**.

### Les Oreillons

**Infection virale** qui se transmet par voie respiratoire ou par contact avec la salive. L'infection se manifeste par une **inflammation des glandes parotides** et parfois d'autres glandes.

Complications : **Pertes d'audition** chez l'enfant, **stérilité** chez l'adolescent, **pancréatite**, **orchite**,...

### La Rubéole

**Infection virale transmissible par voie respiratoire et de la mère à l'enfant**. Cette maladie bénigne passe souvent **inaperçue**. On peut observer de la **fièvre** et une **éruption cutanée**. C'est une infection potentiellement **grave** lorsqu'elle survient chez une **femme enceinte non immunisée**.

Complications : **malformation congénitale grave** lorsque survient chez une **femme enceinte non immunisée**.

#### SOURCES :

E.Pilly 2020, 27<sup>ème</sup> Édition  
www.santepubliquefrance.fr  
Calendrier vaccinal 2022

www.pasteur.fr  
www.who.int  
www.ameli.fr

## POURQUOI ?



L'OMS a mis en place un **plan d'élimination de la rougeole et de la rubéole** en Europe. En France, ces 2 maladies sont à **déclaration obligatoire**.

L'immunité contre la rougeole et la rubéole est **acquise à vie**, et l'Homme est le seul réservoir. Ces 2 maladies pourraient donc être éradiquées si au moins **95% de la population était vaccinée**.

## POUR QUI ?



**Contre-indiqué chez l'immunodéprimé et la femme enceinte** car c'est un vaccin vivant atténué.

**Obligatoire chez :**

- **Tous les enfants nés depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018**. Le schéma vaccinal comprend **2 doses à 12 et 16-18 mois**.
- Les personnes **nées après 1980** doivent avoir reçu 2 doses de ROR (espacées d'au moins 1 mois) quels que soient les antécédents vis-à-vis des 3 maladies.
- Personnes **nées avant 1980** :
  - Les **professionnels de santé et de la petite enfance** ainsi que les personnes en **contact avec des immunodéprimés** s'ils n'ont pas été vaccinés auparavant et sans antécédents de rougeole ou de rubéole doivent recevoir **1 dose**.
  - **Femmes non vaccinées** contre la rubéole et ayant un **projet de grossesse** : **1 dose**.

**Autour d'un cas de rougeole** : vaccination dans les **72h** suivant le contact pour les personnes insuffisamment ou non vaccinées.

- **Cas contact de rougeole** : mise à jour recommandée pour obtenir les 2 doses.
- **Cas groupés d'oreillons** : mise à jour pour obtenir 2 doses de ROR et proposition d'une **3<sup>ème</sup> dose** si la dernière injection de ROR date de plus de 10 ans.

## IDÉES REÇUES ?



Bonjour docteur ! Je suis la maman de Louis, 10 mois. J'ai entendu dire que le vaccin ROR pouvait être dangereux pour sa santé, qu'il y avait toujours des effets secondaires comme l'autisme ! Qu'en est-il réellement ?

C'est le **seul moyen de le protéger** contre ces virus. Les effets indésirables sont connus : fièvre, éruptions cutanées bénignes. Les effets indésirables sévères sont extrêmement rares comparés aux risques de complications de ces maladies et une vingtaine d'études menées dans 6 pays sur plusieurs millions de personnes ont réfuté l'hypothèse d'un lien entre vaccination et autisme.

Mais est-ce que c'est vraiment aussi efficace d'administrer 3 vaccins en même temps ? Et faut-il vraiment faire la deuxième dose ?

L'avantage d'un **vaccin combiné**, c'est que Louis ne recevra qu'une seule piqûre au lieu de trois. L'administration de ces trois vaccins ne rend pas moins efficace la vaccination car le corps humain est capable de **réagir simultanément à des antigènes différents**. En revanche, si Louis ne reçoit qu'une seule dose de vaccin, il peut ne pas être protégé ; il sera encore susceptible de contracter l'une de ces maladies et de la transmettre à d'autres. 5 à 10 % des personnes vaccinées contre la rougeole ne répondent pas à la 1<sup>ère</sup> dose.

Merci docteur, effectivement il est préférable de vacciner Louis dès ses 12 mois.