


- VACCIN - COQUELUCHE



Maladie respiratoire causée par une bactérie : *Bordetella pertussis*. **Très contagieuse**, elle se transmet par les gouttelettes émises lors de la toux.

En France, les nourrissons sont le plus souvent contaminés par des adultes (parents > 50%, fratrie environ 20% des cas).

Or les **cas graves**, parfois mortels, surviennent chez les **très jeunes nourrissons** avec une hospitalisation plus de 9 fois sur 10.

CONTRE QUOI ?



La coqueluche, dans sa forme typique, se manifeste par :

- Une **rhinite**
- Pas ou peu de fièvre
- **Quintes de toux** sévères (pouvant entraîner des vomissements) suivies d'une reprise de **respiration bruyante** appelée « **chant du coq** »

Plus d'informations sur la [fiche Coqueluche](#)

COMPLICATIONS

Chez les nourrissons de moins de 6 mois, la coqueluche peut prendre une forme grave et mortelle (déshydratation, complications neurologiques et pulmonaires).

Une immunité limitée dans le temps : qu'elle soit acquise par la maladie ou par le vaccin, l'immunité s'estompe au fil des ans. Sans rappel, les adultes perdent leur protection. Souvent peu symptomatiques, ils deviennent alors la principale source de contamination des très jeunes nourrissons de leur entourage, encore trop jeunes pour être pleinement protégés.

POUR QUI ?

OBLIGATOIRE

- **Le nourrisson** : **primo-vaccination obligatoire** chez **tous les enfants** nés à partir de janvier 2018.

Schéma vaccinal : une injection à **2 et 4 mois**.

Rappel à **11 mois**.

RECOMMANDATIONS

- **Les rappels de l'enfance** et de l'adolescence à 6, 11-13 ans.
- **Les rappels adultes** à 25, 45, 65 ans, puis tous les 10 ans.
- Vaccination des **femmes enceintes** fortement recommandée à chaque grossesse (de préférence entre 20 et 36 semaine d'aménorrhée).
- Vaccination de la **mère en post-partum**, avant la sortie de la maternité si elle n'a pas été vaccinée pendant la grossesse.
- **Stratégie de « cocooning »** : en l'absence de vaccination de la mère pendant la grossesse, la vaccination est recommandée pour tout l'entourage proche (adelphe, parents, grands-parents) si leur dernier rappel de coqueluche date de plus de 5 ans.
- Vaccination **des personnels soignants, les professionnels de la petite enfance et les baby-sitters**.

Le vaccin contre la coqueluche n'existe que sous forme combinée avec le vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP).



SOURCES :
[HAS](#)
[Vaccination Info Service](#)

[Santé publique France](#)
[Calendrier vaccinal 2026](#)
[Site officiel Santé Gouv](#)



IDÉES REÇUES ?



Bonjour docteur ! J'ai une question à vous poser. Est-ce que l'immunité contre la coqueluche est définitive?

C'est une question très intéressante! L'immunité contre la coqueluche n'est pas définitive, il est possible de contracter la coqueluche plusieurs fois dans sa vie.
Pour une protection optimale, le vaccin nécessite plusieurs rappels, l'immunité obtenue ne dure qu'une dizaine d'années.

Je dois faire vacciner mon nourrisson cette semaine contre la coqueluche. Je suis stressé car j'ai entendu parler de cas de mort subite du nourrisson après vaccination. Qu'en pensez-vous?

Les études n'ont retrouvé **aucun lien de causalité** entre l'administration de ces vaccins et la mort subite du nourrisson (MSN).

La coqueluche est une maladie grave et les complications chez le nourrisson sont réelles et peuvent entraîner des pneumopathies, apnées, ralentissement du rythme cardiaque, voire une détresse respiratoire accompagnée d'une défaillance multi-viscérale (coqueluche maligne) d'évolution souvent mortelle.

Est-ce que mon enfant peut continuer à aller à la crèche s'il a la coqueluche?

L'éviction des collectivités (crèche, établissement scolaire...) doit durer **5 jours** à partir du début du traitement antibiotique.