


ARBRE DECISIONNEL DE LA PRISE EN CHARGE DE LA GRIPPE



(1) Patient à risque = tout patient éligible à la vaccination (dont femme enceinte, obèse...) - Patient à très haut risque = patient avec comorbidité décompensée ou susceptible de l'être par la grippe.

* contact étroit : personne partageant le même lieu de vie que le cas index ; contact direct en face à face à moins d'un mètre lors d'une toux, d'un éternuement ou d'une discussion.

** traitement ATV = traitement antiviral

<u>Antiviral inhibiteur de la neuraminidase : mode d'administration et posologies usuelles</u>				
	chez l'adulte		chez l'enfant	
	curatif	prophylaxie	curatif	prophylaxie
OSELTAMIVIR	Voie orale 75 mg x 2 /jour <u>pendant 5 jours</u>	voie orale 75 mg /jour <u>pendant 10 jours</u>	voie orale 13 ans et plus : 75 mg x2/jours <u>pendant 5 jours</u> 1-12 ans : 10 à 15kg : 30 mg x 2/j 15 à 23 kg : 45 mg x 2/j 23 à 40 kg : 60 mg x 2/j > 40 kg : 75 mg x 2/j <u>pendant 5 jours</u> 6 mois-1 an : 3 mg/kg x 2/j <u>pendant 5 jours</u>	Voie orale 13 ans et plus : 75mg x1/jour <u>pendant 10 jours</u> 1-12 ans : 10 à 15 kg : 30 mg x1/j 15 à 23 kg : 45 mg x1/j 23 à 40 kg : 60 mg x1/j > 40 kg : 75 mg x1/j <u>pendant 10 jours</u>