

<b>Éléments d'orientation selon les durées d'incubation</b>	
<b>Paludisme</b>	<b>P.falciparum</b> : 1 semaine à 2 mois <b>Autres espèces</b> : 1 semaine à plusieurs années
<b>Incubation courte &lt; 2 semaines</b>	<b>Arboviroses</b> (< 7 jours) <b>Diarrhées infectieuses</b> ( <i>cf fiche diarrhées au retour de voyage</i> ) <b>Typhoïde</b> <b>Spirochètes</b> : borréliose, leptospirose, rickettsiose
<b>Incubation longue &gt; 2 semaines à plusieurs mois</b>	<b>Hépatites virales</b> (A : 15-45 jours ; B : 30-120 jours ; E : 10-40 jours) <b>Amœbose hépatique</b> (variable) <b>Primo infection VIH</b> (2 à 8 semaines) <b>Schistosomose</b> en phase d'invasion (2 à 6 semaines)

### MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

- Paludisme
- Arbovirose : Dengue, Chikungunya, Zika, fièvre jaune
- Fièvres typhoïde et paratyphoïde
- Hépatite A aiguë
- Infection aiguë symptomatique par le virus de l'hépatite B
- VIH (quel que soit le stade)
- Schistosomose (bilharziose) urogénitale autochtone

