

SURVEILLANCE ET PRÉVENTION DE L'ANTIBIORÉSISTANCE EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ (SPARES)



Points clés 2024 en France

Résistance bactérienne aux antibiotiques en 2024 dans 1 059 établissements

Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM)

10,4%
Proportion de SARM chez *Staphylococcus aureus* isolé d'hémocultures

Cible <10%

0,13
Densité d'incidence SARM / 1 000 JH

Cible 2025 0,15

Enterococcus faecium résistant à la vancomycine (ERV)

0,6%
Proportion d'ERV chez *Enterococcus faecium* d'hémocultures

Cible 2025 <1%

Enterobacterales

Klebsiella pneumoniae BLSE

0,18
Densité d'incidence de *K. pneumoniae* produisant une BLSE / 1 000 JH

Cible 2025 0,15

Densité d'incidence Enterobacterales produisant une carbapénémase / 1 000 JH

0,037


Densité d'incidence Enterobacterales produisant une BLSE / 1 000 JH

0,58

Proportion de souches produisant une carbapénémase chez *K. pneumoniae* isolée d'hémocultures

1,4%


Principales EBLSE



Escherichia coli BLSE

Klebsiella pneumoniae BLSE


Enterobacter cloacae complex BLSE



6,5%
% de BLSE au sein de l'espèce



20,2%
% de BLSE au sein de l'espèce



20,1%
% de BLSE au sein de l'espèce