




SURVEILLANCE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES EN VILLE ET SECTEUR MÉDICO-SOCIAL



RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES DES ENTEROBACTERIES URINAIRES EN VILLE ET EN EHPAD ANNÉE 2024



LES DONNÉES SONT ISSUES DE


135 LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE SUR 220

EN RÉGION PAYS DE LA LOIRE

- Laboratoire participant à PRIMO
- Laboratoire ne participant pas à PRIMO


ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS

- 68 730 ANTIBIOGRAMMES D'ENTÉROBACTÉRIES
- 68 270 ANTIBIOGRAMMES URINAIRES D'ENTÉROBACTÉRIES
- LES RÉSULTATS PAR SEXE CONCERNENT LES 18 ANS ET PLUS



Répartition des antibiogrammes urinaires
selon les espèces d'entérobactéries
(n = 68 270)

* *Klebsiella oxytoca*, *Klebsiella aerogenes* et *Enterobacter cloacae* complex



Répartition des antibiogrammes
d'entérobactéries selon le prélèvement
(n = 68 730)

RÉSISTANCES OBSERVÉES

Escherichia coli (urines)



À DOMICILE

EN EHPAD

C3G
Céphalosporines 3ème
génération
(Céfotaxime ou ceftriaxone ou
ceftazidime)

Départements	Effectifs Ville
Loire-Atlantique	16168
Maine-et-Loire	13855
Mayenne	4791
Sarthe	10465
Vendée	10001

FQ
Fluoroquinolones




Départements	Effectifs Ehpad
Loire-Atlantique	792
Maine-et-Loire	1289
Mayenne	355
Sarthe	760
Vendée	529


RÉSISTANCES OBSERVÉES

Escherichia coli (urines)

CHEZ LA FEMME



CHEZ L'HOMME




- C3G à privilégier en probabiliste sur les formes graves
- Les FQ sont les molécules de référence du fait de leur excellente diffusion dans les infections urinaires masculines fébriles mais prévenir le patient des effets indésirables ([note Ansm d'août 2023](#))
- Cotrimoxazole : bonne efficacité clinique en cas de sensibilité de la bactérie

¹ Éviter les FQ en probabiliste si prescrites dans les 6 derniers mois


² C3G et FQ : utilisation réservée aux pyélonéphrites, le relais par une autre molécule est à adapter selon l'antibiogramme

 
**SELON L'HÉBERGEMENT ET LE
 SEXE CHEZ LES > 65 ANS**

♀ CHEZ LES FEMMES



♂ CHEZ LES HOMMES



RÉSISTANCES OBSERVÉES

Klebsiella pneumoniae (urines)

À DOMICILE

EN EHPAD


C3G

Céphalosporines 3ème
génération
(Céfotaxime ou ceftriaxone ou
ceftazidime)

Départements	Effectifs Ville
Loire-Atlantique	1792
Maine-et-Loire	1500
Mayenne	473
Sarthe	1124
Vendée	759

FQ

Fluoroquinolones




Départements	Effectifs Ehpad
Loire-Atlantique	134
Maine-et-Loire	207
Mayenne	44
Sarthe	92
Vendée	39


RÉSISTANCES OBSERVÉES

Klebsiella pneumoniae (urines)

CHEZ LA FEMME



CHEZ L'HOMME



- C3G à privilégier en probabiliste sur les formes graves
- Pour les FQ, prévenir le patient des effets indésirables ([note Ansm d'août 2023](#))
- Cotrimoxazole : bonne efficacité clinique en cas de sensibilité de la bactérie

• Amoxicilline : résistance naturelle


¹ Éviter les FQ en probabiliste si prescrites dans les 6 derniers mois

² C3G et FQ : utilisation réservée aux pyélonéphrites, le relais par une autre molécule est à adapter selon l'antibiogramme




SELON L'HÉBERGEMENT ET LE SEXE CHEZ LES > 65 ANS

♀ CHEZ LES FEMMES



♂ CHEZ LES HOMMES



LIENS UTILES



[Lien vers le site RéPIA - PRIMO](#)



[Lien vers le site CRATB Pays de la Loire](#)

Structure publique régionale d'expertise et d'appui aux professionnels de santé pour un meilleur usage des antibiotiques et la lutte contre l'antibiorésistance



**MÉMO DURÉES
D'ANTIBIOTHÉRAPIE**
SEPTEMBRE 2025



**RECOMMANDATIONS
SUR LES ANTIBIOTIQUES**
[\(Lien pour en commander\)](#)