


SURVEILLANCE ET PRÉVENTION DE L'ANTIBIORÉSISTANCE EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ (SPARES)

POINTS CLÉS 2023 EN PAYS DE LA LOIRE

BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES





37 établissements participants

RÉSISTANCES BACTÉRIENNES AUX ANTIBIOTIQUES

Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM)

6,2%

Proportion de SARM chez Staphylococcus aureus isolé d'hémocultures Cible <10%


0,10

Densité d'incidence SARM/1 000 JH

Cible 2025 0,15 Enterococcus faecium résistant à la vancomycine (ERV)

0,0%

Proportion d'ERV chez Enterococcus faecium isolé d'hémocultures





Cible 2025
0,12
0,15
Densité d'incidence
K. pneumoniae BLSE/1 000 JH

Enterobacterales résistantes aux carbapénèmes

O,O9

Cible

1 établissements participants

Densité d'incidence *Enterobacterales* productrices de BLSE/1 000 JH

0,47

0,025

Densité d'incidence *Enterobacterales* productrices de carbapénémase/1 000 JH

Proportion de souches résistantes aux carbapénèmes chez *K. pneumoniae* isolée d'hémocultures

1,3%

