

Pour protéger les résidents, vaccinez-les et incitez leur entourage à faire de même !

	VRS	Pneumocoque	Zona	COVID19	Grippe	Coqueluche ET	Tétanos
Généralités	L'infection à VRS est responsable d'une <b>hausse des hospitalisations</b> et des décès chez les personnes âgées.  Plus d'infos <a href="#">ici</a>	Le pneumocoque est la première cause de <b>méningite et de pneumonie bactériennes</b> .  Plus d'infos <a href="#">ici</a>	Le <b>zona</b> peut donner des <b>douleurs violentes et persistantes</b> , impactant l' <b>autonomie</b> et la <b>qualité de vie</b> du résident.  Plus d'infos <a href="#">ici</a>	Dans le monde, <b>80% des personnes décédées</b> sont âgées de 60 ans et plus.  Plus d'infos <a href="#">ici</a>	On estime, qu'en France, <b>2 000 vies/an</b> sont sauvées chaque année <b>chez les personnes de 65 ans et plus</b> grâce à la vaccination.  Plus d'infos <a href="#">ici</a>	Les personnes ayant des comorbidités ou celles <b>âgées de 80 ans et plus</b> , sont plus sujets aux formes graves.  Plus d'infos <a href="#">ici</a>	En France, entre 2012 et 2021, 48 cas de tétanos ont été déclarés, tous chez des personnes non à jour de leur vaccination : 14 sont décédées.  Plus d'infos <a href="#">ici</a>
Pour qui ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>résidents ≥ 75 ans</li> <li>résidents ≥ 65 ans avec pathologies respiratoires ou cardiaques chroniques</li> </ul> <p style="text-align: center;">Tous les résidents sont concernés</p>						
Comment ?	Avec le vaccin <b>Arexvy®</b> , le vaccin <b>Abrysvo®</b> ou le vaccin <b>mRESVIA®</b> Ces trois vaccins ne sont pas encore remboursés dans cette indication  La nécessité d'une dose de rappel n'a pas encore été établie à ce jour	<b>Une dose unique de Prevenar20®</b>  Résident ayant reçu un schéma <b>Prevenar13® + Pneumovax®</b> : faire une dose de <b>Prevenar20®</b> si le schéma remonte à plus de 5 ans  Résident ayant reçu un <b>Prevenar13® OU un Pneumovax®</b> : faire une dose de <b>Prevenar20®</b> si le vaccin remonte à plus de 1 an	<b>Shingrix® : 2 doses</b> espacées d'au moins 2 mois  Si <b>antécédent de zona</b> ou résident déjà vacciné par <b>Zostavax®</b> → 2 doses de vaccins Shingrix® espacées d'au moins 2 mois, à débiter après un <b>délai d'au moins 1 an</b> après le zona ou le Zostavax®	En EHPAD, <b>2 doses</b> par an sont recommandées, <b>espacées de 6 mois</b> : une à l'automne et une au printemps  Un délai minimum de 3 mois après une infection ou une précédente dose est à respecter	Une dose avant la période épidémique.  Un <b>rappel</b> chaque année est nécessaire	Rappel à <b>25, 45, 65 ans puis tous les 10 ans à 75, 85, 95 ans...</b>  NB : le vaccin contre la coqueluche et le vaccin contre le tétanos sont obligatoirement combinés avec le vaccin contre la diphtérie et la poliomyélite.	
Quand ?	Automne (1 fois)	Dès qu'on y pense (1 fois)	Dès qu'on y pense (1 fois)	Printemps et automne (annuel)	Automne (annuel)	Dès qu'on y pense (+ rappels)	
Co-administration	Co administration possible, sur des sites différents. Une limite pratique de 4 injections le même jour est généralement admise. Pas de délai particulier à respecter entre vaccins inertes s'ils ne sont pas réalisés le même jour.*						*Un intervalle de deux semaines est toutefois requis entre l'administration du vaccin Abrysvo® et celle du dTPCa chez la femme enceinte.
Par qui ?	Médecins, infirmiers, pharmaciens						

En cas de doute sur l'indication d'un vaccin, vacciner ! Pas de risque à vacciner « par excès »

# Vaccination : êtes-vous à jour ?

## 2025 calendrier simplifié des vaccinations 65 ans et plus

Personnes de 65 ans et plus					
	65 ans	75 ans	80 ans	85 ans	95 ans et +
<b>DTP-Coqueluche</b>	1 dose	1 dose		1 dose	1 dose
<b>Pneumocoque</b>	1 dose				
<b>Grippe</b>	1 dose par an				
<b>Covid-19</b>	1 dose par an		2 doses par an		
<b>Zona</b>	2 doses (à 2 mois d'intervalle)				
<b>VRS</b>	1 dose pour certaines maladies chroniques		1 dose		

### Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite (DTP) et Coqueluche

Pour que la vaccination reste efficace, un rappel est recommandé à l'ensemble des personnes âgées de 65 ans, puis tous les 10 ans.

### Pneumocoque

La vaccination est recommandée à l'ensemble des personnes âgées de 65 ans et plus.

### Grippe

La vaccination est recommandée, chaque année, à l'ensemble des personnes âgées de 65 ans et plus car elles sont plus à risque de complications.

### Zona

La vaccination est recommandée à l'ensemble des personnes âgées de 65 ans et plus.

### VRS

A l'automne, la vaccination est recommandée à l'ensemble des personnes âgées de 75 ans et plus. Elle est également recommandée aux personnes âgées de 65 ans et plus ayant des pathologies respiratoires chroniques (particulièrement broncho pneumopathie chronique obstructive) ou cardiaques (particulièrement insuffisance cardiaque).

### Covid-19

Chaque automne, la vaccination contre la Covid-19 est recommandée à l'ensemble des personnes âgées de 65 ans et plus. Chaque printemps, une dose additionnelle est recommandée aux personnes âgées de 80 ans et plus, aux résidents d'EHPAD et USLD, et aux personnes immunodéprimées quel que soit leur âge.

Pour en savoir plus



**VACCINATION  
INFO SERVICE.FR**

Le site de référence qui répond à vos questions



