

Tableau n°3 : Tableau des constituants des vaccins pouvant être responsables d'allergies.

COMPOSANTS EN CAUSE DANS LA RÉACTION ANAPHYLACTIQUE	VACCINS CONCERNÉS
Anaphylaxie lors de l'injection précédente d'un vaccin donné	Vaccin concerné
Anaphylaxie suite à l'administration locale ou systémique de néomycine, de polymyxine	<ul style="list-style-type: none"> • Hexyon[®], Infanrix Hexa[®] • InfanrixQuinta[®], Pentavac[®] • Boostrixtetra[®], Infanrix tetra[®], Repevax[®], Tetravac[®], Revaxis[®] • M-M-RVAXPRO[®], M-M-RVAXPRO[®], Priorix[®] • Twinrix[®], Avaxim[®], Havrix[®], Vaqta[®] • Varilix[®], Varivax[®]
Anaphylaxie après ingestion de levure	<ul style="list-style-type: none"> • HBVAXPRO[®], Engerix-B[®], Fendrix[®] • Infanrix-Hexa[®], Hexyon[®] • Twinrix[®] • Gardasil[®]
Anaphylaxie après ingestion de gélatine	<ul style="list-style-type: none"> • M-M-RVAXPRO[®] • Fluenztetra[®]
Anaphylaxie après injection de l'anatoxine diphtérique (CRM-197)	<ul style="list-style-type: none"> • Vaccin contenant une valence diphtérique • Prévenar 13^{®*} • Menveo^{®*}, Menjugate^{®*}
Anaphylaxie après injection de l'anatoxine tétanique	<ul style="list-style-type: none"> • Vaccin contenant une valence tétanique • Neisvac^{®**}, Nimenrix^{®**}

* Vaccin contenant de l'anatoxine diphtérique

** Vaccin contenant de l'anatoxine tétanique